

# Errata

## Korrekturblatt zum LANUV-Fachbericht 36: Rote Liste der gefährdeten Pflanzen, Pilze und Tiere in NRW, 4. Fassung

Im Folgenden sind die Korrekturen zu den nach Drucklegung aufgefallenen Fehlern aufgeführt. Bd. 1 entspricht dabei dem Band 1 Pflanzen und Pilze, Bd. 2 dem Band 2 Tiere:

- zu Bd. 1 und Bd. 2, S. 37, Tabelle 7:

| Artengruppe                     | Taxa-Zahl<br>des Artenverzeichnisses<br>(etabliert) | etablierte<br>Neobiota im<br>Artenverzeichnis | Anteil<br>der Neobiota |
|---------------------------------|---|---|------------------------|
| Farn- und Blütenpflanzen        | 1.920   | 206   | 10,7 %                 |
| Moose                           | 775   | 3   | 0,4 %                  |
| Armleuchteralgen                | 21  | 0   |                        |
| Rotalgen und Braunalgen         | 18  | 2   | 11,1 %                 |
| Flechten                        | 1.110   | 0   |                        |
| Großpilze                       | 3.615   | 3   | 0,1 %                  |
| <b>Summe - Pflanzen, Pilze:</b> | <b>7.459</b>  | <b>214</b>                                    | <b>2,9 %</b>           |
| Säugetiere                      | 78  | 8   | 10,2 %                 |
| Vögel                           | 195   | 8   | 4,1 %                  |
| Kriechtiere                     | 7   | 0   |                        |
| Lurche                          | 18  | 0   |                        |
| Fische und Rundmäuler           | 59  | 8   | 13,5 %                 |
| <b>Summe - Wirbeltiere:</b>     | <b>357</b>  | <b>24</b>                                     | <b>6,7 %</b>           |
| Schmetterlinge                  | 1.709   | 0   |                        |
| Wildbienen und Wespen           | 713   | 0   |                        |
| Ameisen                         | 63  | 0   |                        |
| Laufkäfer                       | 369   | 8   | 2,1 %                  |
| Wanzen                          | 608   | 14  | 2,3 %                  |
| Heuschrecken                    | 51  | 1   | 1,9 %                  |
| Libellen                        | 71  | 0   |                        |
| Steinfliegen                    | 65  | 0   |                        |
| Eintagsfliegen                  | 70  | 0   |                        |
| Webspinnen                      | 662   | 3   | 0,5 %                  |
| Muscheln und Schnecken          | 219   | 30  | 13,7 %                 |
| Flusskrebse                     | 6   | 4   | 66,6 %                 |
| <b>Summe - Wirbellose:</b>      | <b>4.606</b>  | <b>60</b>                                     | <b>1,3 %</b>           |
| <b>Gesamtsumme:</b>             | <b>12.422</b>                                       | <b>298</b>                                    | <b>2,4 %</b>           |

- zu Bd. 1 und Bd. 2, S. 40, Tabelle 11 unten, Zeilen alle Arten:

|            |      |        |     |     |       |       |     |    |   |       |        |
|------------|------|--------|-----|-----|-------|-------|-----|----|---|-------|--------|
| Alle Arten | 2011 | 11.463 | 941 | 831 | 1.126 | 1.235 | 963 | 78 | — | 5.174 | 45,1 % |
|            | 1999 | 9.162  | 663 | 772 | 1.069 | 1.224 | 352 | —  | 5 | 4.080 | 44,5 % |

- zu Bd. 1 und Bd. 2, S. 38, Tabelle 8 (Bd. 1 Zeile Anteil in %, Bd. 2 beide Zeilen):

| ausgewertete Arten | in *  | in D | in V | nicht in RL  | in G | in R | in 3  | in 2  | in 1 | in 0 | RL-Taxa      | Anteil RL-Taxa an ausgewerteten Taxa |
|--------------------|-------|------|------|--------------|------|------|-------|-------|------|------|--------------|--------------------------------------|
| <b>11.677</b>      | 5.693 | 382  | 328  | <b>6.403</b> | 81   | 968  | 1.269 | 1.147 | 847  | 962  | <b>5.274</b> |                                      |
| <b>Anteil in %</b> | 48,8  | 3,2  | 2,8  | <b>54,8</b>  | 0,7  | 8,3  | 10,9  | 9,8   | 7,2  | 8,2  | <b>45,2</b>  | <b>45,2</b>                          |

- nur zu Bd. 2, S. 39, Tabelle 9 oben, Zeile Moose:

|       |     |            |    |    |     |     |    |    |            |   |    |     |            |               |
|-------|-----|------------|----|----|-----|-----|----|----|------------|---|----|-----|------------|---------------|
| Moose | 775 | <b>775</b> | 81 | 54 | 131 | 142 | 38 | 24 | <b>470</b> | 0 | 29 | 276 | <b>305</b> | <b>60,6 %</b> |
|-------|-----|------------|----|----|-----|-----|----|----|------------|---|----|-----|------------|---------------|

- nur zu Bd. 2, S. 40, Tabelle 11 oben, Zeilen Farn- und Blütenpflanzen 1999 und Moose 2011:

|       |      |              |    |    |     |     |    |    |  |            |               |
|-------|------|--------------|----|----|-----|-----|----|----|--|------------|---------------|
|       | 1999 | <b>1.904</b> | 95 | 93 | 215 | 303 | 65 |    |  | <b>771</b> | <b>40,5 %</b> |
| Moose | 2011 | <b>775</b>   | 81 | 54 | 131 | 142 | 38 | 24 |  | <b>470</b> | <b>60,6 %</b> |

- nur zu Bd. 2, S. 42, in Tabelle 12 sind die Vögel Feldsperling, Kuckuck und Haussperling von der 1. Spalte in die 2. Spalte zu verschieben.